

## 第二部分 医疗服务能力与质量安全监测数据的不计分指标

| 章编号 | 节编号 | 条编号   | 点编号 | 指标  |
|-----|-----|-------|-----|---|
| 第二章 | 二、  | (七)   |     | ICD 低风险病种患者住院死亡率（第一诊断为以下编码的患者，可以同时存在其他诊断）                       |
| 第二章 | 三、  | (二十四) |     | 输血反应发生例数和发生率（ICD-10 编码：T80.0, T80.1, T80.2, T80.8, T80.9 的出院患者） |
| 第三章 | 二、  | (三)   |     | 感染性休克 3h 集束化治疗（bundle）完成率                                       |
| 第三章 | 二、  | (四)   |     | 感染性休克 6h 集束化治疗（bundle）完成率                                       |
| 第三章 | 二、  | (七)   |     | ICU 患者预计病死率   |
| 第三章 | 二、  | (八)   |     | ICU 患者标化病死指数  |
| 第三章 | 三、  | (五)   |     | 急性心肌梗死（STEMI）患者平均门药时间及门药时间达标率                                   |
| 第三章 | 三、  | (六)   |     | 急性心肌梗死（STEMI）患者平均门球时间及门球时间达标率                                   |
| 第三章 | 四、  | (四)   |     | 血培养污染率  |
| 第三章 | 四、  | (十三)  |     | 检验报告不正确率  |
| 第三章 | 六、  | (四)   |     | 多重耐药菌感染发现率  |
| 第三章 | 六、  | (五)   |     | 多重耐药菌感染检出率  |
| 第三章 | 七、  | (七)   |     | 一二级手术台均用量   |
| 第三章 | 七、  | (八)   |     | 三四级手术台均用量   |
| 第三章 | 八、  | (三)   |     | 急性 PTE 患者行危险分层相关检查比例  |
| 第三章 | 八、  | (十六)  |     | 住院成人社区获得性肺炎（CAP）患者进行 CAP 严重程度评估的比例                              |
| 第三章 | 八、  | (十七)  |     | 低危 CAP 患者住院比例   |
| 第三章 | 八、  | (二十)  |     | 住院 CAP 患者接受机械通气的比例  |
| 第三章 | 十、  | (一)   |     | 癫痫与惊厥癫痫持续状态   |
| 第三章 | 十、  | (二)   | 23  | 脑梗死(23.发病 24 小时内脑梗死患者行血管内治疗术中<br>新发部位栓塞发生率)                     |

|     |      |      |    |  |
|-----|------|------|----|--|
| 第三章 | 十、   | (二)  | 26 | 脑梗死(26.发病 24 小时内脑梗死患者行血管内治疗术后 90 天良好神经功能预后率) |
| 第三章 | 十、   | (三)  |    | 帕金森病   |
| 第三章 | 十、   | (四)  |    | 颈动脉支架置入术                                     |
| 第三章 | 十、   | (五)  | 2  | 脑血管造影术(2.脑血管造影术中非离子型对比剂应用率)                  |
| 第三章 | 十一、  | (一)  |    | IgA 肾病                                       |
| 第三章 | 十一、  | (二)  | 1  | 血液净化技术(1.治疗室消毒合格率)                           |
| 第三章 | 十一、  | (二)  | 16 | 血液净化技术(16.透析患者的血清铁蛋白和转铁蛋白饱和度定时检验完成率)         |
| 第三章 | 十一、  | (二)  | 17 | 血液净化技术(17.透析患者的血清前白蛋白定时检验完成率)                |
| 第三章 | 十二、  | (十二) | 1  | 护理级别占比 (1.特级护理占比)                            |
| 第三章 | 十三、  | (九)  |    | 用药错误报告率                                      |
| 第三章 | 十三、  | (十)  |    | 严重或新的药品不良反应上报率                               |
| 第三章 | 十三、  | (增六) |    | 抗肿瘤药物使用金额占比                                  |
| 第三章 | 十三、  | (增七) |    | 不合理处方占比                                      |
| 第四章 | 十三、  |      |    | 胶质瘤 (初发, 手术治疗)                               |
| 第四章 | 十四、  |      |    | 垂体腺瘤 (初发, 手术治疗)                              |
| 第四章 | 三十五、 |      |    | 糖尿病肾病  |

说明: 不计分指标是从《国家标准》中剔除的指标, 但考虑到指标具有一定导向性, 为鼓励和引导医院向《国家标准》靠拢, 该类指标鼓励医院监测、填报, 作为衡量医院总体水平的参考因素。